

**ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТНОСТИ НАТУРАЛЬНО ОКРАШЕННОГО ХЛОПКА,  
ЭКСПОЗИЦИЯ В УСЛОВИЯХ ВЛАГИ, ИНСОЛЯЦИИ, СПОТНАННОЙ  
МИКРОФЛОРЫ ВОЗДУХА  
EXPOSURE OF MOISTURE, INSOLATION AND MICROFLORA TO  
CHANGES OF COTTON COLOR**

Таблица 1 - Образцы волокна ряда селекционных линий хлопчатника *G. hirsutum* L.: исходные и после 8-ми месячной экспозиции

Stocks names, samples after 8 month exposure

Цветовая гамма, color

желто-зеленая, green

желто-оранжевая, orange

исходная, before

экспонированная,

исходная, before

экспонированная,

after

after




Таблица 2.- Образцы натурально окрашенных волокон ряда селекционных линий хлопчатника *G. hirsutum* L. после воздействий окружающей среды  
Stocks names, samples before and after exposure :

Исходные, before	Подвергнутые воздействию, after exposure		
	спонтанная микрофлора, 30 сут. spontaneous microflora	грибы, 28 сут, fungus	Инсоляция 16 час, insolation

